


Nom commun	Nom botanique	Dénomination	Nature génétique	Origine	Obtenteur (code)	Année de diffusion	Mainteneur
Pomme de terre	<i>Solanum tuberosum</i>	<b>Maharevo</b>	Clone	CIP	CIP (381.381.20) FIFAMANOR (H2)	1999	FIFAMANOR / CIP

Tubercules



Coupe transversale



## CARACTERES MORPHOLOGIQUES

### TUBERCULE

- Forme : arrondie
- Couleur de la peau : rouge claire
- Couleur de la base de l'œil : jaune
- Couleur de la chair : blanche
- Profondeur des yeux : moyenne

### FLEUR

- Couleur : rouge foncée

### FEUILLE

- Couleur : Vert claire

## CARACTERES AGRONOMIQUES

- Cycle (à maturité) : 110 – 115 jours
- Hauteur : 55 – 60 cm
- Rendement moyen : 22 – 30 t/ha
  - gros tubercules : moyen
  - tubercules moyens : élevé
  - petits tubercules (écarts) : moyen
- Longueur de la dormance : moyenne

### Comportement vis-à-vis des bioagresseurs

- Mildiou (*Phytophthora infestans*) : résistante
- Alternariose (*Alternaria solani*) : moyennement résistante
- Bactériose vasculaire (*Ralstonia solanacearum*) : sensible
- Enroulement de la pomme de terre (PLRV) : moyennement résistante

## CARACTERES TECHNOLOGIQUES

- Teneur en matière sèche : assez bonne
- Transformation : bonne pour frites et chips
- Aptitude au stockage : bonne